

# 高原みどり(インゲン)栽培暦

作型と作業名				月	旬	病害虫の発消長	防除体系	
<p>トンネル早熟栽培</p> <p>早出し栽培 (ポット育苗)</p> <p>普通栽培 (直播)</p> <p>遅出し栽培 (直播)</p>	<p>播種</p> <p>定植・トンネル掛</p> <p>中耕</p> <p>収穫開始 敷ワラ1回目</p> <p>敷ワラ2回目</p> <p>ほ場整理 土中堆肥施用</p>	<p>播種</p> <p>定植</p> <p>敷ワラ1回目 収穫開始</p> <p>敷ワラ2回目</p> <p>ほ場整理 土中堆肥施用</p>	<p>播種</p> <p>敷ワラ1回目 収穫開始</p> <p>敷ワラ2回目</p> <p>ほ場整理 土中堆肥施用</p>	<p>播種</p> <p>敷ワラ1回目 収穫開始</p> <p>敷ワラ2回目 収穫開始</p> <p>播種</p> <p>敷ワラ1回目 敷ワラ2回目 収穫開始</p> <p>ほ場整理 土中堆肥施用</p>	1	上		
					1	中		
					1	下		
					2	上		
					2	中		
					2	下		
					3	上		
					3	中		
					3	下		
					4	上		
					4	中		
					4	下		
5	上							
5	中							
5	下							
6	上							
6	中							
6	下							
7	上							
7	中							
7	下							
8	上							
8	中							
8	下							
9	上							
9	中							
9	下							
10	上							
10	中							
10	下							
<p>有利販売のためには、長期間出荷することが望まれる。 労働力に合わせた作型を選択するとともに、作型を組み合わせ て出荷労力の分散を図ることが望ましい。 特に、トンネル栽培に取り組み早期からの出荷を行い、出荷期 間の延長を目指しましょう。</p>				11	上		<p>発生したら散布する</p> <p>・ハダニ類 ダニロンフロアブル 1000倍</p> <p>・ミナミキイロアザミウマ ポルスター乳剤 1500~2000倍</p>	
				11	中			
				11	下			
12	上							
12	中							
12	下							

アブラムシ類(つる枯れ病)  
フキノメイガ  
かさ枯病  
炭そ病  
ハダニ類  
アブラムシ類  
炭そ病・角斑病

播種時 VC粉剤  
2~3g/株

定植時 アドマイヤー1粒剤  
1~2g/株

収穫開始1週間前  
エルサン乳剤 1000倍

6/上 クラビットホルテ  
水和剤 500倍

6/下 トリアジン水和剤50  
600倍

7/中 ニッソラン水和剤  
2000倍

7/下 バイレトン水和剤5  
1000倍

8/中 トリアジン水和剤50  
600倍