

夏秋きゅうり栽培暦

作業名	作型	月	旬	病害虫の発消長	防除体系				
露地栽培	トンネル栽培	露地栽培	1	上		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> 発生したら散布する薬剤（殺菌剤） ・炭そ病、褐斑病 ゲッター水和剤 1000倍 ベンレート水和剤 2000倍 アミスター20フロアブル 1500倍 ・炭そ病 トリアジン水和剤50 400倍 （かぶれ注意） ・うどんこ病 カリグリーン水溶剤 800倍 ラリー水和剤 4000倍 ・つる枯病 ロブルール水和剤 1000倍 ・ベと病 サンドファンC水和剤 500倍 </div>			
				中					
				下					
			2	上			露地栽培における標準防除体系 （播種：4/25、接木 5/5、定植：5/25、 収穫：6/25～） ＊の薬剤はこの時期に必ず散布する。		
				中					
				下					
			3	上				堆肥施用 播種 基肥施肥 接木 マルチかけ 定植 畦上げ・追肥 敷ワラ1回目 追肥・葉かき ・摘芯随時 収穫開始 主枝摘芯 敷ワラ2回目 収穫終了 ほ場整理 分析用土壌採取	
				中					
				下					
			4	上					播種時 園芸培土使用の場合は オートサイド水和剤 5.15 ビスダイセン水和剤 800倍 デイフレックス乳剤 1000倍 定植時 アドマイヤー1粒剤 1～2g/株 6.3 ポリオキシシンAL水和剤 1000倍 （7日前まで） 6.10 キノゾドーフロアブル 1200倍 6.17 ダコニール1000 1000倍 6.24 ベルクート水和剤 4000倍 チェス水和剤 3000倍 7.1 ビスダイセン水和剤 800倍 7.6 トップジンM水和剤 1500倍 7.11 ダコニール1000 1000倍 7.16 ベルドー水和剤 500倍 アドマイヤー水和剤 2000倍 7.21 トップジンM水和剤 1500倍 7.28 サンドファンC水和剤 500倍 8.4 ダコニール1000 1000倍 カネマイトフロアブル 1500倍 8.11 ベルドー水和剤 500倍 8.18 ベルクート水和剤 4000倍 ピラニカEW 2000倍 8.25 デランK水和剤 500倍 9.1 トップジンM水和剤 1500倍 チェス水和剤 3000倍 9.8 ベルドー水和剤 500倍 9.15 ダコニール1000 1000倍 9.22 デランK水和剤 500倍 アドマイヤー水和剤 2000倍 9.29 トップジンM水和剤 1500倍 10.5 デランK水和剤 500倍
				中					
				下					
5	上	アブラムシ類 ベと病 うどんこ病 つる枯病 炭そ病・褐斑病 アブラムシ類 ベと病 アブラムシ類							
	中								
	下								
6	上		発生したら散布する薬剤（殺虫剤） ・ウリノメイガ アファーム乳剤 2000倍 ・ミカンキイロアザミウマ ・ミナミキイロアザミウマ モスピラン水溶剤 2000倍 コテツフロアブル 2000倍 ・オンシツコナジラミ モスピラン水溶剤 2000倍 ・ハダニ類 バロックフロアブル 2000倍						
	中								
	下								
7	上								
	中								
	下								
8	上								
	中								
	下								
9	上								
	中								
	下								
10	上								
	中								
	下								
11	上								
	中								
	下								
12	上								
	中								
	下								