

あぶくま安心なす栽培暦

| 作業名 | 作型 | 月 | 旬 | 病害虫の発生活長 | 天敵を温存した防除体系 |
|--|--------|----|-------------|----------------------------------|---|
| 露地栽培 露地栽培 | トンネル栽培 | 3 | 上 中 下 | | |
| 土づくり・深耕 堆肥・土壌改良資 材施用 | | 4 | 上 中 下 | | 定植前 DDVP乳剤 + ベンレート水和剤 (× 2000) (× 3000) |
| 基肥施肥 畦立て・マルチ 支柱立て | | 5 | 上 中 下 | アブラムシ類 | 菌核病 ベンレート水和剤 (× 2000) |
| 定植 仮支柱・誘引 株元かん水 腋芽除去・敷藁 整枝 誘引 | | 6 | 上 中 下 | オオニジュウヤホシテントウ スリップス フキノメイガ | 灰色かび病 ユーパレン水和剤 + コテツフロアブル (× 800) (× 2000) ロブラールアクア500 (× 1500) サンヨール乳剤 (× 700) フルピカアブル + アファーム乳剤 (× 2000) (× 2000) |
| 収穫開始 追肥 | | 7 | 上 中 下 | ハダニ類 | 褐毛ん病 フルピカアブル + コテツフロアブル (× 2000) (× 2000) モレスタン水和剤 (× 2000) |
| 敷きわら | | 8 | 上 中 下 | | うどんこ病 フルピカアブル + アファーム乳剤 (× 2000) (× 2000) |
| 追肥・かん水 誘引・整枝 葉かき | | 9 | 上 中 下 | | アブラムシ類 灰色かび病 |
| 収穫終了 | | 10 | 上 中 下 | | アブラムシ類 チェス水和剤 (× 3000) DDVP 75 乳剤 (× 2000) バッサ乳剤 (× 2000) |
| | | 11 | 上 中 下 | | スリップス、ハダニ類 コテツフロアブル (× 2000) アファーム乳剤 (× 2000) |
| 後かたづけ | | 12 | 上 中 下 | | オオニジュウヤホシテントウ、フキノメイガ サイアノックス乳剤 (× 1000) |

発生が認められたら

灰色かび病、菌核病
 スミブレンド水和剤 (× 1500)
 ベンレート水和剤 (× 2000)
 うどんこ病
 アミスター 20 F L (× 2000)
 トリフミン水和剤 (× 3000)
 アブラムシ類
 チェス水和剤 (× 3000)
 DDVP 75 乳剤 (× 2000)
 バッサ乳剤 (× 2000)

スリップス、ハダニ類
 コテツフロアブル (× 2000)
 アファーム乳剤 (× 2000)
 オオニジュウヤホシテントウ、フキノメイガ
 サイアノックス乳剤 (× 1000)