夏秋トマト・ミニトマト栽 培 暦

作業名	作型	月	旬	病害虫の発生消長	防除体系
夏秋標準栽培 上中旬（2月播種）		1	上		
			中		
			下		
播種 接ぎ木		2	上		
			中		
			下		
仮植 基肥施用	トンネルで保温	3	上		
			中		
			下		ﾃﾞﾗﾝK：８００倍
畦立て・マルチ 苗の馴化 定植		4	上	アブラムシ類	ﾀﾞｺﾆｰﾙ 1000：１０００倍+ ｵﾙﾄﾗﾝ(水)：１０００倍 定植時　ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ 1(粒)1 ～ 2g/株 ★ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁ利用の場合はﾁｪｽ(粒)1g　を定植 ３日前ﾎﾟｯﾄ処理。
			中	スリップス類	
			下		
ホルモン処理 芽かき・誘引		5	上		ﾋﾞｽﾀﾞｲｾﾝ(水)：８００倍
			中		ﾀﾞｺﾆｰﾙ 1000：１０００倍＋ ｱﾌｧｰﾑ(乳)：２０００倍
灌水			下		ﾍﾟﾝｺｾﾞﾌﾞﾛｱﾌﾞﾙ：１０００倍
追肥		6	上	マメハモグリバエ	ﾋﾞｽﾀﾞｲｾﾝ(水)：８００倍＋ ﾓｽﾋﾟﾗﾝ(水溶)：２０００倍
収穫開始			中	オオタバコガ	ﾍﾞﾙｸｰﾄ(水)：３０００倍
			下	オンシツコナジラミ	ﾃﾞﾗﾝK：５００倍＋ ﾁｪｽ(水)：３０００倍
下葉かき		7	上	疫病	ﾀﾞｲﾏｼﾞﾝ(水)：１５００倍
			中	葉かび病	ﾕｰﾊﾟﾚﾝ(水)：５００倍＋
			下	灰色かび病	ﾍﾞﾙｸｰﾄ(水)：３０００倍
		8	上		
			中		ｶﾞｰﾄﾞｼﾞｪｯﾄ(水)：１０００倍
			下		ﾍﾞﾙｸｰﾄ(水)：３０００倍＋ ﾁｪｽ(水)：３０００倍
摘芯		9	上	アブラムシ類	ｶｽﾐﾝﾎﾞﾙﾄﾞｰ：１０００倍
			中		ﾋﾞｽﾀﾞｲｾﾝ(水)：８００倍＋ ﾓｽﾋﾟﾗﾝ(水溶)：２０００倍
			下		
		10	上		
			中		
			下		
収穫終了 後片付け		11	上		
			中		
			下		
		12	上		
			中		
			下		

★発生が認められたら★

葉かび病
アミスター20FL ×2000
トリフミン水和×3000

灰色かび病
ゲッター(水)×1000
スミブレンド(水)×2000

疫病
クリーンヒッター×1000
ホライズンﾄﾞﾗｲﾌﾛｱﾌﾞﾙ×2000

オオタバコガ
ガードジェット(水)×1000
アファーム(乳)×2000

マメハモグリバエ
アファーム(乳)×2000
カスケード(乳)×2000

アブラムシ類
マラソン（乳)×2000
チェス（水)×3000

コナジラミ類
チェス(水)×3000
モスピラン(水溶)×2000

スリップス類
マッチ乳　×2000